



장관감염증을 유발하는 노로바이러스 예방수칙

이렇게 추운데 노로바이러스 감염증에?

00시 한 초등학교에서 노로바이러스 의심 집단 장관감염증 발병

00 초교서 장관감염증 증상... 6명 **노로바이러스** 검출


000 내 학교 노로바이러스 의심 집단설사 증가...
주의당부

00 어린이 집단 장관감염증 원인은 '**노로바이러스**'

최근 노로바이러스가 원인으로 의심되는
집단 장관감염증 발생 사례가 증가하고 있습니다.
영하의 날씨에도 살아남아 장관감염증을 일으키는 **노로바이러스!**

자세히 알아보까요? >>

노로바이러스란?



* 2018년 노로바이러스 감염증 표본감시 신고 현황, 질병관리본부 감염병포털, (단위:명)

노로바이러스는 **인체 내 장염을 일으키는 바이러스**입니다.
주로 **11월부터 다음 해 4월까지** 많이 발생하며,
전염성이 강해 어린이집, 학교 등 집단 시설에서
집단 설사를 일으킬 수 있는 주요 원인균 중 하나입니다.

노로바이러스의 전파 방법은?



오염된 음식·물



환자 접촉

수도꼭지,
문고리 등 접촉

노로바이러스에 **오염된 음식과 물을 섭취**하였거나,
환자 접촉을 통한 사람 간 전파가 가능합니다.
 또한, 노로바이러스에 감염된 환자가 손을 씻지 않고 만진
수도꼭지, 문고리 등을 손으로 만진 후 입을 만지거나
 음식물 섭취 시 감염될 수 있습니다.

노로바이러스 감염증의 **증상**은?



노로바이러스 감염증은 대개 음식물 섭취 후 1-2일간의 잠복기를 거친 후 **구토, 설사** 등의 증상이 나타나고 **복통, 오한, 발열**이 나타나기도 합니다.

대개 2~3일이 지나면 자연적으로 회복되나, 구토나 설사가 심한 경우엔 입원 치료를 필요로 하기도 합니다.

노로바이러스 감염증 예방방법은?

일반인



흐르는 물에 비누로 30초 이상 자주 손씻기
(특히, 화장실 사용 후, 기저귀 교체 후,
식품 섭취 또는 조리 전)



음식은 충분히 익혀 먹기
(특히 굴, 생선, 조개 등 수산물)



물은 끓여서 마시기

노로바이러스 감염증 예방방법은?

환자



흐르는 물에 비누로 30초 이상 자주 손씻기
(특히, 화장실 사용 후, 기저귀 교체 후,
식품 섭취 또는 조리 전)



식품을 다루거나 조리하지 않기



구토, 설사 등의 증상이 없어진 후
2일까지 공동생활 하지 않기

**장관감염증을 일으키는
노로바이러스,
겨울에도 방심하지 말고
항상 주의해야 합니다.**

